

Insecten Cabinet

Nach der Natur gezeichnet
und gestochen
von Jacob Sturm Junior.

1791.

II=tes Stük.

Zu finden in Nürnberg bey dem Verfasser.


Stük 2, 1791. 1.



Scarabaeus porcatus.


BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT
OF
ENTOMOLOGY


Stük 2, 1791



Hister unicolor.



BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT
OF
ENTOMOLOGY




Dermestes violaceus.



Stük 2, 1791



Anthrenus Scrophulariae.



Ptinus imperialis.


BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT
OF
ENTOMOLOGY

Stük 2, 1791. 6




Ptinus Scotias.





Nicrophorus Vespillo.

Z.D.



Silpha obscura.

Stük 2, 1791




Opatrum Sabulosum.





Cassida grossa.





Cryptocephalus sericeus.

Z.D.

Stük 2 1791.




Chrysomela speciosa.



Z.D.

Stük 2



Curculio Scr

lanipes, ist nicht Hel.)
lden wollenen Helops (quisquilius; wenig
r, der bekanntlich viel größer, anders geformt
is (höchst wahrscheinl. H. glaber. Bom
Voct. aemula (die abgebildeten Exem
plaren alle ihre natürliche Schönheit nicht
Ar betrifft, so finden wir die Grundfarb
llers, u. grünlichtgrau, bey der Bomb.
licht Mischung u. die Silberstriche in der
aemula die Rückenflecken am Unterrand
d. 5 Jun. 1793.

Nürns Insecten cabinet.

ie Abbildungen der hier auf einzelnen Blättern einzeln gelieferten Insekten aus allen Classen sind durchgängig sehr gut ausgefallen; nur trifft zuweilen die Illumination nicht mit andern Exemplaren überein. Ueberhaupt ist H. Nürn schon aus dem Natur-forscher als ein vortreflicher Insektenmahler bekant, u. was darnach an der Farben-richtung hier u. da zu verbessern seyn dürfte, ist mehr auf die Rechnung des Illumi-nisten, als auf die seinige zu schreiben; wenn nicht anders zuweilen der Fall eingetret-en seyn mag, daß die abgebildeten Exemplare vielleicht zu frisch, oder zu verbleicht gewesen sind, u. also im ersten Falle ihre eigenthümliche Farbe noch nicht erhalten, im letzten dieselbe schon verloren gehabt haben. — Im 12 N. sind vom Scarab. cylindricus Flügeldecken u. Füße braun erleuchtet, da sie doch in der Natur schwarz sind. — Melolontha variabilis ist Melol. brunnea. An Cetonia Stictica werden die Härchen u. der Metallglanz vermißt. Der unter dem Namen Dermestes scanicus abgebildete Käfer ist die Ips humeralis Fabr. u. kein Dermestes.

2ter N. — Hister unicolor. scheint der Form der Streife wegen, eher Herbsts H. 12 stria-tus vorzustellen! — Ptinus imperialis etwas zu hell illuminirt. Curculio albinus ist sonst dunkler als die Abbildung.

3tes N. Scarabaeus testudinarius das Exemplar welches H. Nürn hier abgebildet hat, scheint mit Staub oder Erde bedeckt gewesen zu seyn, weil er die Flügeldecken ein-färbig gelblichtgrau vorstellt, das doch bekanntlich gegen die Natur ist; denn der Käfer hat schwarze Flügeldecken mit runden röthlichtgelben Flecken. Scarabaeus quisquilius (eigentl. merdarius) Dermestes fenestralis (ist schwerlich dieser Käfer, den das System ganz anders beschreibt. Curculio salicis ist Curc. Crux Fabr. Curc. salicis ist grö-ßer, hat auch noch gelbe Flecken u. Springfüße. Carabus piceus (gewiß nicht dieser Käfer der um vieles kleiner ist. ~~[illegible]~~ [illegible] hat H. Sturm



Z.D.


Stük 2 1791.

13.



Curculio Scrophulariae.

den Carabus leucophthalmus abbilden wollen. Helops (laniger, ist nicht Hel.) quisquilius; wenigstens gewiss nicht der angegebene Käfer, der bekanntlich viel grösser, anders geformt, u. metallfärbig ist. Helops quisquilius (höchst wahrscheinl.) H. glaber. Bombix argentina; Bomb. compressa; Noct. aemula (die abgebildeten Exemplare dieser drey Schmetterlingsarten scheinen alle ihre natürliche Schönheit nicht mehr besessen zu haben, denn was die erste betrifft, so finden wir die Grundfarbe unsere frischen Exemplar viel dunkler, u. grünlichgrau, bey der Bomb. compressa vermissen wir die bläuliche Mischung u. die Silberstriche in den weisslichten Flecken, u. bey der Noct. aemula die Kupferflecken am Unterrande). v. Oberdeutsch. allg. Lit. Zeit. v. 5 Jun. 1793.




BRITISH MUSEUM (NAT. HIS
DEPARTMENT
OF
ENTOMOLOGY

Stük 2 1791.



Curculio imperialis.



Z.D.







Curculio albinus.

Z.D.

Stük 2 1791 16.




Curculio Morio.



Z.-D.

Stük 2 1791.




Clerus formicarius.



Notoxus mollis.

Z.D.


Stük 2, 1791.



Notoxus monoceros.

Z.D.


Stuk 2 1791



Cerambyx alpinus.

Z.D.

Stük 2 1791.



Saperda praeusta.





Lampyris corusca.

Z.D.



Elater thoracicus.

Z.D.



Forficula minor.


BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT
OF
ENTOMOLOGY



Cimex festivus.



